gallinas y demas aves que se alimentan de granos, puesto que tienen un buche y un estómago que puede tenerse por una semi-molleja, por su espesor en la parte del fondo: de manera que los buitres están al parecer formados, no solo para ser carnívoros sino granívoros y aun omnívoros.

EL BUITRE Ó BUITRE GRANDE.

El buitre llamado tal ó el buitre grande, es el ave que Belon ha denominado equivocadamente buitre grande ceniciento, y que casi todos los naturalistas posteriores á aquel han llamado tambien buitre ceniciento, á pesar de tener mas de negro que de ceniciento. Es mayor y mas corpulento que el águila comun, pero un poco menos que el grifo, del que no es difícil distinguirle: 1.º por el cuello que tiene cubierto de un plumon mucho mas largo y mas espeso, y es el del mismo color que las plumas del lomo: 2.º por una especie de corbata blanca que sale de ambos lados de la cabeza, se estiende en dos ramas hasta debajo del cuello, y orla por ambos lados un espacio bastante ancho, de color negro, por bajo del cual hay un collar estrecho y blanco: 3.º por los pies que en el buitre están cubiertos de plumas pardas, al paso que en el grifo los pies son amarillentos ó blanquecinos; y finalmente por los dedos, que son amarillos en el buitre, y pardos ó cenicientos en el grifo.

EL BUITRE CON PENACHO.

Este buitre, que es menos grande que los tres anteriores, lo es sin embargo bastante para que se le coloque entre los buitres grandes: lo que con mas acierto podemos decir de él, es lo que manifiesta Gesner, único naturalista que haya visto varias de estas aves. «El buitre, dice, que los alemanes llaman *hasengeier*, (buitre de las liebres) tiene el pico negro y retorcido en la punta, ojos feos, el cuerpo grande y fuerte, las alas anchas, la cola larga y recta, la pluma de color rojo negruzco y los pies amarillos. Cuando está quieto en tierra y perchado, endereza las plumas de la cabeza que se asemejan á dos cuernos que desaparecen cuando vuela. Tiene cerca de seis pies de vuelo; anda bien y dá pasos de quince pulgadas de estension: persigue á toda clase de aves, y hace de ellas su presa: caza tambien liebres, conejos, zorras jóvenes, cervatillos y hasta peces: su ferocidad es tal, que no se le puede domesticar; no solo persigue su presa al vuelo precipitándose de lo alto de un árbol ó de la cumbre de algun peñasco, sino á la carrera: hace mucho ruido cuando vuela: habita en las selvas espesas y desiertas sobre los árboles mas altos: come la carne y las entrañas de los animales vivos y hasta los cadáveres: aunque es muy voraz puede estar catorce dias sin tomar alimento. En enero de 1815 se cogieron dos de estas aves en Alsacia, y el año siguiente se encontraron otras dos en un nido construido sobre un roble muy alto, á alguna distancia de la ciudad de Misen.»

Todos los buitres grandes, es decir el percnoptero,

el grifo y el buitre con penacho, producen poco y una vez al año únicamente. Aristóteles dice que no ponen mas que uno ú dos huevos: construyen sus nidos en sitios tan elevados, y de acceso tan difícil, que son muy pocas las veces que se halla alguno. Estos deben buscarse en las montañas elevadas y desiertas, que es á donde los buitres habitan durante toda la buena estacion, pero hasta que las nieves y hielos empiezan á cubrir la cumbre de las montañas, no se les vé bajar á las llanuras y viajar en invierno hácia los paises cálidos, pues parece que los buitres temen mas al frio que la mayor parte de las águilas: escasean en el Norte, y es de suponer que no hay ninguno en Suecia ni en los paises situados mas allá, puesto que Mr. Linnæus en la especificacion que hace de todas las aves de Suecia, nada dice de los buitres. Sin embargo, en el artículo siguiente hablaremos de un buitre que se nos ha remitido de Noruega, pero esto no impide que abunden mas en los climas cálidos, en Egipto, en Arabia, en las islas del Archipiélago, y en otras varias provincias de Africa y Asia: su cuero es casi tan espeso como el del cabrito: está cubierto de un plumon finísimo, muy tupido y muy cálido; se hacen de él escelentes prendas de abrigo.

Ademas me parece que el buitre negro, que segun Belon es comun en Egipto, es de la misma especie que el buitre propiamente dicho, que llama buitre ceniciento, y que no deben separarse como lo han hecho algunos naturalistas, puesto que el mismo Belon, único que los ha indicado, no los separa, y habla de los cenicientos y de los negros como formando ambos la especie del buitre grande, ó buitre propiamente dicho; de manera que es probable que los haya en efecto negros y otros cenicientos que no hemos visto. Acontece con el buitre negro lo que con el águila negra, que ambos pertenecen á la especie comun del buitre ó del águila. Aristóteles tuvo razon en decir que el género del buitre grande era multiforme, puesto que se compone en efecto de tres especies: del grifo, del buitre grande y del buitre con penacho, sin contar el percnóptero que Aristóteles creyó debia separar de los buitres y agregar á las águilas. No sucede lo mismo con el buitre pequeño, del que nos vamos á ocupar, y el que creo forma una sola especie en Europa; así es que este filósofo tuvo tambien razon cuando dijo que el género del buitre grande era mas multiforme, es decir, que contenia mas especies que el del buitre pequeño.

EL BUITRE PEQUEÑO.

Réstanos ahora hablar de los buitres pequeños que en mi sentir se diferencian de los grandes que hemos indicado con los nombres de percnóptero, grifo, buitre grande y buitre con penacho, no solo en el tamaño sino en otros caractéres particulares. Aristóteles, como he dicho, no ha hecho de ellos mas que una especie, y nuestros nomencladores cuentan tres que son: el buitre pardo, el de Egipto y el de cabeza blanca. Este último que es uno de los mas pequeños, y que representamos aquí, parece en efecto pertenecer á una especie diferente de los dos primeros, pues se diferencia en que tiene la parte baja de las piernas y los pies desnudos, mientras que aquellos las tienen cubiertas de pluma. Es muy probable que este buitre de cabeza blanca sea el buitre pequeño blanco de los antiguos, que se halla comunmente en Arabia, en Egipto, en Grecia, en Alemania y hasta en Noruega,

de donde se nos ha remitido. Puede notarse que su cabeza y la parte inferior del cuello, están desprovistas de pluma, y son de color rojizo, y que es casi todo blanco, á escepcion de las plumas grandes de las alas que son negras. Estos caractéres son mas que suficientes para reconocerle.

De las demas especies de buitres pequeños indicados por Mr. Brisson, con los nombres de buitre pardo y buitre de Egipto, me parece que es menester suprimir, ó mas bien separar el segundo, es decir, el buitre de Egipto, el que, segun la descripcion que Belon ha hecho de él, no es buitre, sino una ave de distinto género, que creyó debia llamar sacre egipcio. Nos queda, pues, únicamente el buitre pardo, acerca del cual solo advertiré que no alcanzo las razones que determinaron á Mr. Brisson á asemejar esta ave al *águila* heteropodea de Gesner, creo al contrario que en vez de hacer de esta águila heteropodea un buitre, deberia suprimirse de la lista de las aves, pues su existencia no está probada en manera alguna; ningun naturalista la ha visto. Gesner, el único que ha hablado de ella, y al que todos han copiado, solo tenia de ella un dibujo que hizo grabar, y cuya figura creyó correspondia al género de las águilas y no al de los buitres; y el nombre que le dá de águila heteropodea, está tomado del dibujo en el que una de las piernas de esta ave era azul y la otra de color pardo blanquecino, y confiesa que no ha podido saber nada de cierto acerca de esta especie, y que si habla de ella y le dá el nombre de águila heteropodea, es suponiendo la certeza del mismo dibujo.

De consiguiente, una ave dibujada por un desconocido, llamada con arreglo á un dibujo incorrecto, que solo la diferencia del color de las dos piernas, debe hacer suponer inexacto, una ave que no ha sido nunca vista por ninguno de los que han querido hablar de ella. ¿puede ser buitre ó águila? ¿puede existir? Creo, pues, que refiriendo esta ave al buitre pardo se ha obrado muy gratuitamente.

Ademas, el ave que realmente existe, que no debe referirse en manera alguna al águila heteropodea que no existe, y que nos ha sido enviada de Africa y de la isla de Malta, nos remitimos al artículo siguiente, en el cual trataremos de las aves estrangeras que tienen relacion con los buitres.

AVES ESTRANGERAS

QUE TIENEN RELACION CON LOS BUITRES

I. El buitre pardo, ó de Malta.—El ave remitida de Africa y de la isla de Malta, con el nombre de *buitre pardo*, del que hemos hablado en el artículo anterior, que es una especie y una variedad particular en el género de los buitres, y que no se encuentra en Europa, debe mirarse como perteneciente á los climas del Africa, y particularmente á los paises inmediatos al mar Mediterráneo.

II. El sacre ó buitre de Egipto.—Esta ave llamada por Belon *sacres de Egipto*, y que el doctor Shaw indica con el nombre de achbobba, se vé en grandes bandadas en las tierras estériles y arenosas inmediatas á las pirámides de Egipto; permanece casi siempre en tierra, y se alimenta como los demas buitres de cualquiera clase de carne y aun que esté corrompida. «Es, dice Belon, una ave ruin y nada hermosa: